

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 16.06.2026 09:40:05
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Оценочный материал для диагностического тестирования
Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

НЕОНАТОЛОГИЯ, 11 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Акушерства, гинекологии и перинатологии
Выпускающая кафедра	детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> При возникновении в роддоме группового инфекционного заболевания новорожденных следует:	А. перевести в наблюдательное отделение и назначить лечение Б. оставить на месте, назначив лечение В. немедленно перевести в соответствующий стационар Г. все ответы правильные Д. вызвать инфекциониста	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> На каком этапе внутриутробного развития максимален риск грубого повреждения плода:	А. бластогенез Б. эмбриогенез В. ранний фетальный период Г. поздний фетальный период	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> Первый “перекрест” в лейкоцитарной формуле крови у недоношенных новорожденных происходит:	А. на 4-й день Б. на 5-й день В. на 6-й день Г. после 7-10-го дня	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> Перинатальную смертность составляют:	А. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 28 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 28 дней жизни Б. гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток, гибель новорожденных после 7-х суток внеутробной жизни	низкий

		В. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 22 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток внеутробной жизни	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Степень дыхательной недостаточности оценивают по следующим признакам:	А. частоте дыхания Б. наличию цианоза В. участию в дыхании вспомогательной мускулатуры и втяжению уступчивых мест грудной клетки Г. всем перечисленным признакам	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Время появления физиологической желтухи:	А. 1-е сутки Б. начало 2-х суток В. конец 2-х суток – 3-и сутки Г. после 5-х суток	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите несколько правильных ответов Желтуха в период новорожденности является симптомом:	А. гемолитической болезни Б. микседемы В. пилороспазма Г. адреногенитального синдрома Д. внутриутробных инфекций	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Какой уровень гемоглобина считается нормальным для недоношенного ребенка в возрасте 3 недель?	А. не ниже 120 г/л Б. не ниже 130 г/л В. не ниже 150 г/л Г. не ниже 180 г/л Д. не ниже 200 г/л	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Основные пути передачи внутрибольничной инфекции:	А. через руки персонала Б. через продукты питания В. через белье Г. через предметы ухода Д. через медицинский инструментарий	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ При флегмоне новорожденных первичный воспалительный процесс локализуется:	А. в коже Б. в лимфатических сосудах В. в подкожной клетчатке	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2	Укажите один правильный ответ При флегмоне новорожденных чаще отмечается:	А. нормальная температура Б. субфебрильная температура В. высокая, 39-40 °С, в первые дни заболевания и резкое ее снижение после некроза клетчатки	средний

ОПК-7.3			
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Основное отличие поражения ЦНС при наследственных нарушениях обмена от поражения ЦНС гипоксического генеза:	А. симптомы поражения с возрастом уменьшаются Б. симптомы поражения с возрастом нарастают В. симптомы поражения носят неспецифический характер Г. симптомы поражения ярко выражены с рождения	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Возбудителем флегмоны новорожденного является:	А. сапрофитная флора Б. грамотрицательная флора В. простейшие Г. стафилококк	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Путем передачи ВИЧ-инфекции не является:	А. воздушно-капельный Б. половой В. трансплацентарный Г. гемотрансузионный	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	1. Укажите один правильный ответ 2. Какая причина анемий при рождении встречается чаще других:	А. кровопотеря или гемолиз Б. наследственный микросфероцитоз В. дефицит эритроцитарных ферментов Г. наследственная гипопластическая анемия	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Уровень прямого билирубина преобладает над содержанием непрямого билирубина:	А. при гемолитической анемии Б. болезни Минковского-Шаффера В. атрезии желчевыводящих путей	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ В неонатологии для усиления противомикробного эффекта стартовой терапии ампициллин применяют в сочетании:	А. с эритромицином Б. с гентамицином В. с тетрациклином Г. с сульфаниламидами	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ Новорожденным детям от матерей – носительниц HBs-антигена с профилактической целью показано введение специфического иммуноглобулина в следующие сроки:	А. в первые часы жизни Б. на 2-3-и сутки жизни В. при выписке из родильного дома Г. в возрасте 1 месяца жизни	высокий
ОПК-4.2	Укажите один правильный ответ	А. подчеркнута междолевая плевра	высокий

ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>ответ</i> Какие рентгенологические признаки являются абсолютными при пневмонии у новорожденного:	Б. вздутие легких В. отсутствие четкого контура средостения или диафрагмы Г. инфильтративные изменения Д. гиповентиляция	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-7.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> Какая внутриутробная инфекция часто вызывает поражение глаз и требует обязательной консультации окулиста:	А. краснуха Б. токсоплазмоз В. цитомегалия Г. листериоз Д. герпес-инфекция Е. все перечисленное	высокий