

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 16.06.2026 09:40:05
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e6267485442980996366b1e1d3

Оценочный материал для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ, СЕМЕСТР 9

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	детских болезней
Выпускающая кафедра	детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-3.1	<i>укажите один правильный ответ</i> 1. Хосписная помощь это:	а) вариант эвтаназии; б) философское учение; в) форма социальной помощи населению; г) одна из форм организации паллиативной медицинской помощи	низкий
ПК-2.6	<i>укажите один правильный ответ</i> 2. Когда возбуждение и беспокойное поведение больного сопровождаются стонами и гримасами, это часто истолковывают как свидетельство:	а) физической боли; б) постепенного угасания сознания; в) душевной боли; г) признаков депрессии.	низкий
ПК-3.1	<i>укажите один правильный ответ</i> 3. Задачи отделения паллиативной медицинской помощи:	а) проведение консультаций и обучения родственников уходу за больными ВИЧ-инфекцией со стойкими физическими и/или психическими нарушениями б) комплексная поддержка инкурабельных больных, подбор терапии, решение социальных вопросов и оказание духовной	низкий

		<p>поддержки</p> <p>в) решения социальных вопросов родственников, ухаживающим за больным в домашних условиях;</p> <p>г). проведение обучения среднего и младшего медицинского персонала по вопросам оказания помощи и уходу за инкурабельными больными ВИЧ-инфекцией;</p>	
ПК-3.1	<p><i>укажите один правильный ответ</i></p> <p>4. Самостоятельно обслуживать себя, ходить по коридору, подниматься по лестнице может больной на режиме:</p>	<p>а). строгом постельном</p> <p>б). постельном</p> <p>в). палатном;</p> <p>г). общем;</p>	низкий
ПК-2.6 ПК-3.1	<p><i>укажите один правильный ответ</i></p> <p>5. Борьба с онкологическими заболеваниями предполагает:</p>	<p>а). профилактику и их раннее выявление</p> <p>б) философский подход</p> <p>в) гигиенические действия.</p> <p>г) превентивные меры</p>	низкий
ПК-2.6 ПК3.1	<p><i>укажите один правильный ответ</i></p> <p>6. Факторы, способствующие образованию пролежней:</p>	<p>а) психическая травма;</p> <p>б) длительное пребывание больного в одном положении;</p> <p>в) белковое питание;</p> <p>г) недержание мочи и кала;</p> <p>д) все выше перечисленное</p> <p>А) б, д</p> <p>В) а, г</p> <p>В) б, г</p> <p>Г) а, в,</p> <p>Д) б, в</p>	средний
ПК-3.1	<p><i>укажите все правильные ответы</i></p> <p>7. Препаратами выбора для борьбы с нейропатической болью являются:</p>	<p>а) антиконвульсанты /прегабалин</p> <p>б) парацетамол</p> <p>в) НПВП</p> <p>г) антидепрессанты</p>	средний
ПК-2.6 ПК-3.1	<p><i>укажите все правильные ответы</i></p> <p>8. Характеристиками нейропатической боли являются:</p>	<p>а) жжение;</p> <p>б) стреляющие боли;</p> <p>в) ноющие боли;</p> <p>г) спастические боли;</p>	средний
ПК-2.6	<p><i>укажите один правильный ответ</i></p> <p>9. Какая из приведенных ниже ситуаций свидетельствует о том, что у ребенка в данный момент нет боли?</p>	<p>а) ребенок спит;</p> <p>б) у ребенка нормальное артериальное давление;</p> <p>в) у ребенка нормальная частота дыхания;</p> <p>г) Ребенок говорит, что у него ничего не болит;</p>	средний

ПК-2.6 ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 10. Показания для госпитализации в хоспис:	а) выраженный болевой синдром в терминальной стадии заболевания, преимущественно у пациентов с онкологическими заболеваниями, не поддающийся лечению в амбулаторных условиях, в том числе на дому; б) - острые и неотложные состояния; в) отсутствие условий для проведения симптоматического лечения и ухода в амбулаторных условиях, в том числе на дому; г) нарастание тяжелых проявлений заболеваний, не поддающихся лечению в амбулаторных условиях, в том числе на дому, требующих симптоматического лечения под наблюдением врача в стационарных условиях;	средний
ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 11. Для профилактики ВИЧ-инфекции, назначают лекарственные препараты:	а). Неовир (оксидигидроакридилацетат натрия) б). Циклоферон (меглюмин акридоацетат) в). Лопинавир (ритонавир) г). Зидовудин (ламивудин)	средний
ПК-2.6 ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 12. К задачам паллиативной помощи относятся:	а). адекватное обезболивание и купирование других физических симптомов; б) осуществление эвтанази; в) осуществление эвтанази психологическая поддержка больного и его родственников; г) госпитализация больных в специализированные учреждения социальной помощи; д) госпитализация в стационар;	средний
ПК-2.6 ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 13. Современные повязки для лечения пролежней способствуют:	а) способствуют раневой адгезии; б) защищают рану от вторичного инфицирования; в) ухудшают микроциркуляцию в тканях г).обладают	средний

		обезболивающим действием;	
ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 14. При сборе медицинских отходов запрещается:	а) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий); б) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции; в) снимать вручную иглу без средств защиты (перчаток) со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции г) собирать в специальные пакеты, предназначенные для сбора медицинских отходов; д) Использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.	средний
ПК-2.6 ПК-3.1	<i>укажите все правильные ответы</i> 15. Принципы паллиативной помощи, провозглашенные ВОЗ:	а) не имеет намерений продления или сокращения срока жизни; б) насколько это возможно ограничивает больному активный образ жизни; в) улучшает качество жизни пациента и может также положительно влиять на течение болезни; г) может продлить жизнь больного; д) оказание медикаментозной помощи детям;	средний
ПК-2.6	<i>выберите правильную комбинацию ответов</i> 16. Нелекарственными методами паллиативной помощи при одышке являются: А. Иммобилизация больного Б. Коррекция водного режима В. Психологическое консультирование Г. Оптимизация физической активности и расхода энергии Д. направление потока прохладного воздуха на больного или пдача увлажненного кислорода	А. б, д Б. а, в В. г, д Г. в, г	высокий

ПК-3.1	<p><i>выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p>17. Компонентами паллиативной помощи является:</p> <p>А.высокотехнологичная медицинская помощь; Б. психологическая помощь; В. реабилитационные мероприятия; Г. медицинская помощь и уход</p>	<p>А. а, в Б. б, г В. а,б Г. д, в</p>	высокий
ПК-2.6 ПК-3.1	<p><i>сделайте заключение</i></p> <p>18. У ребенка онкологическое заболевание, сопровождается болевым синдром, какая ситуация свидетельствует о том, что у ребенка в данный момент нет боли</p>	<p>А. Ребенок спит; Б. У ребенка нормальное артериальное давление; Г. в норме ЧСС, ЧД, Д. беспокойный сон.</p>	высокий
ПК-2.6 ПК-3.1	<p><i>Расположите этапы в правильном порядке.</i></p> <p>19. Установить верную последовательность действий медицинского работника при повреждении кожных покровов (укол, порез):</p>	<p>1А. немедленно снять перчатки 3Б. выдавить кровь из ранки 4Г. обработать руки 70% спиртом 6В. под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом 5Д. смазать ранку 5% спиртовым раствором йода; 6Ж. наложить на ранку бактерицидный пластырь; 2З. использованные перчатки погрузить в дезинфицирующий раствор</p>	высокий
ПК-2.6 ПК-3.1	<p><i>дополните:</i></p> <p>20. «симптомами терминальной стадии хронической сердечной недостаточности могут быть:</p> <p>_____</p>	Сильная слабость	высокий