

Математика для экономистов, семестр 1
Код направления подготовки

38.03.01 ЭКОНОМИКА

Направленность (профиль)	Учет, налогообложение, анализ и аудит
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Прикладной математики
Выпускающая кафедра	Экономических и учетных дисциплин

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Уравнение прямой, проходящей через точки $A(-2; 4)$ и $B(-2; -1)$, имеет вид ...	а) $x=-2$ б) $y=4$ в) $2x-4y=0$ г) $x+1-4y=0$	Низкий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	При каком значении k плоскости $3x-5y+kz-3=0$ и $x-3y+2z+5=0$ будут перпендикулярны?	а) -9 б) 3 в) 6 г) 2	Низкий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Скалярное произведение векторов $a = \{-2; -1; 1; 2; 0\}$ и $b = \{0; 1; -1; 1; 2\}$, заданных в ортонормированном базисе, равно...	а) -2 б) 0 в) 3 г) 2 д) 1	Низкий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Радиус окружности $x^2 + y^2 = 16$ равен ...	а) 4 б) 5 в) 8 г) 1	Низкий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Если ко всем элементам какой-либо строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженное на число k , то определитель ...	а) k – раз уменьшится б) k – раз увеличится в) не изменится г) изменит знак д) не изменит знак	Низкий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Какие из векторов $\bar{a} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$, $\bar{b} = 2\bar{i} - 4\bar{j} + \bar{k}$, $\bar{c} = -2\bar{i} + 4\bar{j} - 2\bar{k}$, $\bar{d} = \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$ коллинеарные?	а) \bar{a} и \bar{c} б) \bar{c} и \bar{d} в) \bar{a} и \bar{b} г) \bar{b}, \bar{c} и \bar{d} д) \bar{a} и \bar{d}	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Система линейных алгебраический уравнений называется совместной, если...	а) Все решения только положительные числа б) Не имеет решения в) Имеет хотя бы одно решение	Средний уровень

		г) Если решения состоят только из целых чисел д) Имеет хотя бы одно решение	
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Даны прямые $L_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{2}$, $L_2: \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$. Косинус угла между этими прямыми равен...	а) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ г) $\frac{\sqrt{3}}{3}$	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Уравнение прямой, проходящей через точку $(-1; 1)$ перпендикулярно прямой $7x + 2y - 6 = 0$, имеет вид ...	а) $7x - 2y + 9 = 0$ б) $2x - 7y + 9 = 0$ в) $2x - 7y + 5 = 0$ г) $7x + 2y + 5 = 0$ д) $2x + 7y - 5 = 0$	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Значение определителя $\begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$ есть число ...	а) 1 б) 7 в) 6 г) 0 д) -6	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	В прямоугольной декартовой системе координат уравнение $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ описывает...	а) Эллипс. б) Окружность. в) Две пересекающиеся прямые. г) Параболу. д) Гиперболу.	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Значение неизвестной z из системы $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - 3y + z = 2 \\ 3x + y + z = 8 \end{cases}$ равно ...	а) 3 б) 0 в) 1 г) 2	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Если (x_0, y_0) - решение системы $3x - y = 1$, $-2x + 2y = 2$, то $(2x_0 + y_0)$ равно ...	а) 4 б) -3 в) 0 г) 2	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Определитель $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$ равен ...	а) -2. б) 3. в) 2. г) -3. д) -1.	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Если две строки матрицы линейно зависимы, то определитель...	а) не меняется б) > 0 в) не вычисляется г) $= 0$ д) < 0	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Ранг единичной матрицы n -го порядка равен ...	а) 2 б) 3 в) n г) 1 д) 4	Средний уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Если $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, то $A + 3B = \dots$	а) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ б) $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$	Средний уровень

		<p>в) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$</p> <p>г) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$</p> <p>д) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$</p>	
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Предел функции $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{\operatorname{tg} 2x}$ равен ...	<p>а) 0</p> <p>б) 3/2</p> <p>в) 1/2</p> <p>г) -1/2</p> <p>д) 1</p>	Высокий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Производная функции $\frac{d}{dx} [\operatorname{tg}^2(x^4 - 2)]$ имеет вид ...	<p>а) $\frac{2\operatorname{tg}(x^2 - 2)}{\cos^2(x^4 - 2)}$</p> <p>б) $\frac{8x^3 \operatorname{tg}(x^4 - 2)}{\cos^2(x^4 - 2)}$</p> <p>в) $\frac{4x^3}{\cos^2(x^4 - 2)}$</p> <p>г) $\frac{\operatorname{tg}^3(x^4 - 2)}{3}$</p> <p>д) $2\operatorname{tg}(x^4 - 2)$</p>	Высокий уровень
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	Смешанная частная производная второго порядка функции $z = x^3y - 5xy^2 + 8$ в точке $(1;1)$ равна ...	<p>а) -7</p> <p>б) 7</p> <p>в) -5</p> <p>г) 5</p> <p>д) 0</p>	Высокий уровень